

پریودانتیکس

۷۱) کدام بافت پریودنتال دارای کمترین ثبات (stability) می باشد؟

الف) سمان ب) استخوان ج) اپی تلایوم جانکشنال د) لیگامان پریودنتال

۷۲) نقص فانکشن کدام سلول بعنوان علت اولیه سندروم پاپیلون لفور در نظر گرفته می شود؟

الف) بازوفیل

ب) نوتروفیل

ج) ماستوسیت

د) لنفوسیت T

۷۳) کدام عنصر در محتوای جرم های دندانی، با افزایش عمق پاکت، افزایش می یابد؟

الف) کلسیم ب) فسفر ج) سدیم د) منیزیوم

۷۴) واسکولیت، از رویدادهای کدام مرحله ژنژیویت به حساب می آید؟

الف) Initial

ب) Early

ج) Established

د) Advanced

۷۵) در لثه ای که دارای خوریزی حین پروبینگ (BOP) میباشد، کدام گزینه بیانگر وضعیت بافت همبندی آن میباشد؟

الف) پرسلول و کم کلاژن

ب) پرسلول و پر کلاژن

ج) کم سلول و کم کلاژن

د) کم سلول و پر کلاژن

۷۶) کدام مورد افزایش حجم لثه در گروه افزایش حجم شرایطی (conditional) قرار نمی گیرد؟

الف) نقض یا کمبود ویتامین C

ب) گرانولوماتوزیس و گنر

ج) پایوژنیک گرانلوما

د) پلاسماسل ژنژیواپیتیس

۷۷) در کدام بیماری، درمان با آنتی بیوتیک، نتایج بسیار عالی (Excellent result) دارد؟

الف) NUG

ب) Diphtheria

ج) Secondary stage of syphilis

د) در هر سه بیماری نتایج یکسان است

۷۸) اسمیر باکتریال کدام ضایعه لثه ای ذیل با بقیه متفاوت است؟

د) توبر کولوزیس

ج) پری کروئیت

ب) ژنژیواستو ماتیت هرپتیک اولیه

الف) ژنژیویت نکروزه زخمی

۷۹) تاثیر افزایش سن بر شیوع و شدت پریدونتیت مزمن چگونه است؟

ب) شیوع را افزایش اما بر شدت بی تاثیر است

الف) هم شیوع و هم شدت را افزایش می دهد

د) شدت را افزایش داده اما بر شیوع بی تاثیر است

ج) نه شیوع را افزایش می دهد و نه شدت را

۸۰) مورد اعتماد ترین مارکر تشخیصی در پریدونتیت چیست؟

ب) پروبینگ پریدونتال (عمق پاکت (BOP)

الف) خونریزی حین پروبینگ

د) لقی دندان

ج) خروج چرک

۸۱) کدام مورد بدنبال سایش مکانیکال ناشی از مسواک زدن رخ می دهد؟

(د) اتریشن

(ج) ابفرکشن

(ب) ابریژن

(الف) اروژن

۸۲) کدام رادیوگرافی مزیت بیشتری برای تشخیص ضایعات سه دیواره دارد؟

(ب) بایت و وینگ

(الف) پارالل

(د) پانورامیک

(ج) CBCT

۸۳) در چه گروهی « پوسیدگی »، در بین فاکتورهایی که باید برای تعیین پروگنوز مورد توجه قرار گیرد

قرار می گیرد؟

(الف) Environmental factor

(ب) Local factor

(ج) Prosthetic and restorative factor

(د) Anatomic factor

۸۴) اتصال مجدد PDL-84 ویا اپی تلیوم مارجینال پس از تراش دندان در پروتز ثابت از چه نوعی است؟

(الف) New attachment

(ب) Regeneration

(ج) Epithelial adaptation

(د) Simple healing

۸۵) ارزیابی پاسخ به روند درمان رستوریتیور در کدام فاز درمانی انجام می شود؟

(ب) Non surgical

(الف) Preliminary

(د) Restorative

(ج) Surgical

۸۶) در مورد فایل های با پوشش الماسی (diamond – coated files) کدام گزینه نادرست است؟

الف) احتمال over instrumentation . توسط آن ها وجود ندارد

ب) اینسترومنت ایده آل برای Finishing . نهایی سطح ریشه می باشد

ج) فاقد لبه برنده می باشد

د) انواع باکال – لینگوال مفید ترین آن هاست

۸۷) در کدام طبقه بندی وضعیت پوشش زبان فقط بر اساس Area ارزیابی می شود؟

الف) Gross

ب) winkel

ج) Miyazaki

د) Modified Winkel

۸۸) چنانچه در درمان NUG نیاز به کشیدن دندان باشد چه موقع باید انجام گیرد؟

الف) در جلسه اول مراجعه

ب) در جلسه دوم درمان به صورت اورژانس

ج) در جلسه سوم درمان حتی با وجود علائم حاد

د) چهار هفته بعد از رفع علائم حاد

۸۹) کدام یک از مراحل فاز یک درمان پریدونتولوژی "Targeted oral hygiene" نامیده می شود؟

الف) تجویز دستورات کنترل پلاک

ب) درمان های اندودانتیک

ج) تصحیح ترمیم های ناقص موجود

د) انجام جراحی های پریدونتال

۹۰) بر اساس درجه بندی Rosenberg ، در ارزیابی ارگانولپتیک "Strong malodor" کدام عدد

Score را به خود اختصاص می دهد؟

الف) ۲

ب) ۳

ج) ۴

د) ۵

پاسخنامه

ب	۷۱
ب	۷۲
ج	۷۳
الف	۷۴
الف	۷۵
ب	۷۶
ج	۷۷
د	۷۸
د	۷۹
الف	۸۰
ب	۸۱
ج	۸۲
ج	۸۳
د	۸۴
د	۸۵
الف	۸۶
ب	۸۷
د	۸۸
الف	۸۹
ج	۹۰