

موسسه ماهان مجری برتر دوره های آمادگی آزمون دستیاری دندانپزشکی

۰۲۱ - ۴۲ ۵۵ ۱۱:۰۰

۰۹۳۶۱۷:۰۵۵۱

دندانپزشکی کودکان

۱۵۱- براساس توصیه محققین، غربالگری وضعیت پریدونتال در کودکان از چه زمانی آغاز می شود؟

الف) از زمان شروع Mixed Dentition

ب) بعد از تثبیت اکلوزن شیری

ج) قبل از رویش کامل مولرهای دوم شیری

د) از زمان رویش دندان های پرمولر و مولر دوم دائمی

۱۵۲- کدام تکنیک رادیوگرافی جهت تهیه نگاره بایت وینگ کودکان مطلوب تر است؟

الف) Indirect film

ب) Charged coupled device (CCD)

ج) Photostimulable phosphor storage plate

د) Complementary metal semiconductors (CMOS)

۱۵۳- در بیماری های مختلف زبان که در زیر آمده اند، درگیری کدام پاپیلا صحیح است؟

موسسه دندانپزشکی

www.dmahani.ir

الف) زبان توت فرنگی سفید- پاپیلا foliate

ب) زبان ساه مودار- پاپیلا Filiform

ج) زبان جغرافیایی- پاپیلا fungiform

د) Median Rhomboid Glossitis- پاپیلا circumvallate

۱۵۴- تکامل مورفولوژیک دندان‌های انسیزور کناری شیری حدوداً از چند هفتگی جنینی آغاز می‌شود؟

الف) ۱۱

ب) ۱۳

ج) ۱۵

د) ۱۷

۱۵۵- براساس توصیه مطالعات، کاهش اثر مسواک پس از چند ماه استفاده مداوم و در کدام ناحیه دندان رخ می‌دهد؟

الف) ۳ ماه استفاده مداوم/ نواحی باکال

ب) ۳ ماه استفاده مداوم/ نواحی پروگزیمال

ج) ۴ ماه استفاده مداوم/ نواحی باکال

د) ۴ ماه استفاده مداوم/ نواحی پروگزیمال

۱۵۶- براساس تعریف انجمن دندانپزشکی کودکان آمریکا تعریف (S-ECC) Severe early childhood caries با کدام گزینه زیر منطبق است؟

الف) وجود یک پوسیدگی noncavitated در کودک زیر ۶ سال

ب) پوسیدگی‌های حاد و پیش رونده در دندان‌هایی که معمولاً در مقابل پوسیدگی مقاوم هستند.

ج) وجود حداقل ۲ پوسیدگی پروگزیمالی در دندان‌های کودک زیر ۷۱ ماه

د) وجود white spot روی سطح باکال دندان سانترال شیری بالا در کودک زیر ۳۶ ماه

۱۵۷- کدام یک از عبارتهای زیر در مورد زمان اچینگ درمان فیشور سیلانت صحیح است؟

الف) غالباً زمان اچینگ ۳۰ ثانیه پیشنهاد می‌گردد.

ب) زمان اچینگ دندان‌های شیری معادل دائمی‌ها پیشنهاد می‌شود.

ج) با افزایش زمان اچینگ تا ۱۲۰ ثانیه عمق اچینگ افزایش می‌یابد.

د) با افزایش زمان اچینگ تا ۱۲۰ ثانیه قدرت باند اضافه می‌شود.

۱۵۸- در مورد تکنیک Resin Infiltrate کدام گزینه صحیح است؟

الف) از اسید هیدروکلریک استفاده می شود و جهت سطوح باکال، لینگوال و پروگزیمال کاربرد دارد.

ب) از اسید فسفریک استفاده می شود و جهت سطوح باکال، لینگوال و پروگزیمال کاربرد دارد.

ج) از اسید هیدروکلریک استفاده می شود و جهت فیشورهای سطح اکلوزال دندان های مولر کاربرد دارد.

د) از اسید فسفریک استفاده می شود و جهت فیشورهای سطح اکلوزال دندان های مولر کاربرد دارد.

۱۵۹- در مورد تفاوت های آناتومیک دندان های شیری با دائمی کدام گزینه صحیح است؟

الف) شاخک های پالپی در دندان های شیری گرد شده تر هستند.

ب) ضخامت مینا در دندان های دائمی به نسبت بیشتر و یکنواخت تر است.

ج) ریج فاسیونژنیوالی برجسته دندان های شیری تا کمی پس از CEJ ادامه دارد.

د) حدود پالپی دندان های شیری بیش از دائمی از شکل DEJ تبعیت می کند.

۱۶۰- کدام درمان زیر در دندان های شیری کودکی که مبتلا به Solid Tumor است اندیکاسیون ندارد؟

ب) پوشش غیرمستقیم پالپ

الف) کشیدن دندان

د) ترمیم سه سطحی دندان

ج) پالپوتومی

۱۶۱- کودکی ۴ ساله با درد شدید جهت درمان پوسیدگی دندان D پایین مراجعه کرده است. علائم رادیوگرافی

طبیعی می باشد. در هنگام تراش دندان، با اکسپوژر پالپ مواجه می شویم که یک قطره چرک از آن خارج می شود.

ولی پس از آن خونریزی دیده می شود. طرح درمان این دندان به نظر شما چه می باشد؟

ب) پالپوتومی

الف) پارسیل پالپوتومی

د) پالپکتومی

ج) کشیدن دندان

۱۶۲- جهت حصول بی حسی کامل برای انجام اعمال ترمیمی دندانپزشکی در یک نیم فک کامل پایین، چه نوع

بی حسی پیشنهاد می شود؟

الف) Gow- Gates

ب) بلاک عصب آلوئولار تحتانی و لینگوال

ج) بلاک عصب آلوئولار تحتانی و انفیلتراسیون ناحیه اینسایزور

د) بلاک عصب آلوئولار تحتانی و لانگ باکال

۱۶۳- کدام یک از گزینه های زیر مربوط به مهارت ها و ویژگی های روانی - اجتماعی یک کودک ۵ ساله می باشد؟

الف) دوست دارد ببیند و لمس کند.

ب) داستان را دوست دارد.

ج) سعی در اعمال قدرت دارد.

د) با هم سن و سال های خود در بازی کمال همکاری را دارد.

۱۶۴- همکاری به طور تلفنی گزارش بیماری را به شرح ذیل به شما ارائه می دهد:

کودکی با تأخیر رویش دندان ها، کوچکی فکین با زبان بزرگ و وجود ضایعات سفید رنگ در دهان، شما به کدام یک

از اختلالات زیر بیشتر شک می کند؟

ب) کم کاری هیپوفیز

الف) کرتینیسم

د) سندرم الیس ون کرولد

ج) سندرم داون

۱۶۵- کودکی ۵/۵ ساله مبتلا به دیابت، دندان مولر دوم شیری مندیبل خود را از دست داده ولی هنوز دندان مولر اول دائمی رویش نیافته است. کدام فضا نگهدار پیشنهادی زیر را می توان برای حفظ فضا به کار برد؟

Distal shoe appliance (ب)

Pressure appliance (الف)

Nance appliance (د)

starkey appliance (ج)

۱۶۶- به دنبال از دست رفتن کدام دندان شیری در یک کودک ۵ ساله، بیشترین میزان بسته شدن فضا اتفاق می افتد؟

K(ب)

ل (الف)

۸۳ (د)

۶۴ (ج)

۱۶۷- در صورت نیاز به استفاده از محدودکننده فیزیکی برای کودکی که به دلیل بیماری زمینه ای مستعد هایپرترمی می باشد، کدام وسیله را پیشنهاد می کنید؟

Bed sheet (ب)

Papoose board (الف)

Triangular sheet (د)

rainbow stabilizing system (ج)

۱۶۸- در کودک ۲۰ کیلویی مبتلا به بیماری قلبی و دارای حساسیت به پنی سیلین، کدام داروی خوراکی زیر برای پیشگیری از آندوکاردیت، تجویز می شود؟

(ب) کلاریترومایسین ۲۰۰ میلی گرم

(الف) سفالکسین ۵۰۰ میلی گرم

(د) آزیترومایسین ۳۰۰ میلی گرم

(ج) کلیندامایسین ۲۰۰ میلی گرم

۱۶۹- ریسک انتقال بیماری هپاتیت C در صورت **needle stick** شدن دندانپزشک چقدر است؟

(ب) بین ۱۵ - ۱۰٪

(الف) بین ۵ - ۱٪

(د) بین ۳۵ - ۳۰٪

(ج) بین ۲۵ - ۲۰٪

۱۷۰- کودکی ۹ ساله با اینتروزن دندان ۲۱ به میزان کمتر از ۳ میلی متر مراجعه کرده است. طرح درمان شما کدام

است؟

الف) مشاهده جهت رویش خودبخود تا ۴ هفته

ب) Orthodontic repositioning آنی همراه با درمان پالپ

ج) surgical repositioning از همان ابتدا

د) بدلیل احتمال نکروز پالپ درمان ریشه بلافاصله انجام شود.

پاسخنامه

سؤال ۱۵۲ ← سؤال ۷ فصل ۲

سؤال ۱۵۳ ← سؤال ۶۱ فصل ۳

سؤال ۱۵۵ ← عین سؤال ۳ فصل ۷

سؤال ۱۵۶ ← عین سؤال ۱۱ فصل ۹

سؤال ۱۵۷ ← سؤال ۱۴ فصل ۱۰

www.dmahan.ir

سؤال ۱۵۸ ← سؤال ۱۷ فصل ۱۱

سؤال ۱۵۹ ← سؤال ۸ فصل ۱۱

سؤال ۱۶۱ ← سؤال ۱۲ فصل ۱۳

سؤال ۱۶۳ ← در امتحان ۵ ساله خواسته شده و در سؤالات ما ۴ ساله که با مطالعه جدول جواب سؤال

مشخص است. (سؤال ۳ فصل ۱۶)

موسسه ماهان مجری برتر دوره های آمادگی آزمون دستیاری دندانپزشکی

۰۲۱ - ۴۲ ۵۵ ۱۱:۰۰

۰۹۳۴۱۷:۰۰۵۵۱

سؤال ۱۶۴ ← ترکیب در سؤالات ۲۷ و ۳۰ فصل ۲۲

سؤال ۱۶۵ ← ترکیب سؤال ۲۸ و ۲۹ فصل ۲۲

سؤال ۱۶۶ ← سؤال ۱۰ فصل ۲۲

سؤال ۱۶۷ ← سؤال ۱۱ فصل ۲۵

سؤال ۱۷۰ ← در سؤال ۸ فصل ۲۷، کمتر از ۷ mm آورده شده.



ماهان

موسسه دندانپزشکی

www.dmahan.ir