

بیماری های دهان و فک و صورت

۴۱- در یک مهدکودک، ۸ نفر در یک کلاس، از ۴ روز پیش دچار علائمی نظیر تب، سردرد، بی حالی، بی اشتها و گلودرد شده اند. تنها یافته بالینی وجود وزیکول ها و زخم هایی در کام سخت و نرم و دیواره خلفی لوزه ها می باشد. بهترین تشخیص کدام است؟

الف) عفونت تب خال اولیه  
ب) بیماری دست، پا و دهان

ج) هرپانژینا  
د) فارنژیت حاد لنفوندولر

۴۲- نقش کدام یک از عوامل، در ایجاد و تشدید علائم آفت دهانی و ANUG مطرح می باشد؟

الف) استعمال دخانیات  
ب) منوپوز

ج) ترومای موضعی  
د) دیابت

۴۳- خانم ۴۰ ساله ای با شکایت از قرمزی لثه مارژینال و چسبیده در ناحیه باکال دندان های قدامی مراجعه نموده است. در بررسی ایمونوفلورسنت ضایعه رسوب IgG و کمپلمان در ناحیه لایه بازال گزارش شده است. اولین اقدام درمانی شما کدام است؟

الف) درمان علامتی و پیگیری بیمار  
ب) تجویز کورتیکواستروئید موضعی

ج) تجویز داپسون بصورت سیستمیک  
د) دهان شویه تتراسایکلین

۴۴- نمای بالینی ضیعات اولیه در کدام بیماری بصورت تاول های حاوی ماده زرد رنگ می باشد؟

الف) پمفیگوس ولگاریس  
ب) پمفیگوس وژتانس Hallopeau

ج) واریسلازوستر  
د) بیماری ایمونوگلوبولین A خطی

۴۵- بهترین تشخیص برای زخم با سیر بالینی ۴ هفته‌ای در کام فرد دیابتی با تخریب استخوان کدامست؟

الف) موکورمایکوزیس      ب) هرپس مزمن

ج) عفونت CMV      د) بلاستومایکوزیس

۴۶- علامت بالینی دیررس در ضایعه فیبروز زیر مخاطی کدام است؟

الف) اریتم مخاط لب      ب) پتشی‌های متعدد

ج) پیگمانتاسیون منتشر دهان      د) باندهای فیبروتیک زیر اپی‌تلیوم

۴۷- کدام یک از خصوصیات ضایعه، در افتراق اریتروپلاکیا از کاندیدای اریتماتوز کمک‌کننده می‌باشد؟

الف) اندازه      ب) حدود

ج) سطح      د) محل

۴۸- در معاینه بالینی کودک ۱۰ ساله، پلاک سفید کراتوتیک منتشر در مخاط گونه، زبان و کف دهان که از اوایل

تولد وجود داشته است. مشاهده گردید، مناسب‌ترین تشخیص برای این ضایعه کدام است؟

الف) خال سفید اسفنجی      ب) کاندیدیازیس

ج) لکودام      د) فیبروز تحت مخاطی

۴۹- کدام ضایعه در تشخیص افتراقی پیگمانتاسیون‌های ناشی از مصرف نیترات نقره در دهان مطرح می‌شود؟

الف) لیکن پلان پیگمانته      ب) آمالگام تاتو

ج) نوروفیبروماتوزیس      د) بیماری آدیسون

۵۰- کدام خصوصیت لکه‌های شیر- قهوه‌ای برای تشخیص بیماری نوروفیبروماتوزیس نوع I از اهمیت کمتری برخوردار است؟

الف) اندازه (ب) تعداد

ج) سن شروع (د) پراکندگی لکه‌ها

۵۱- کدام ضایعه رادیولسنت اطراف تاج دندان کانین نهفته فک بالا، دارای شیوع بیشتر و پیش آگهی بهتر می‌باشد؟

الف) آملوبلاستیک فیروما (ب) آملوبلاستوما

ج) آدنوماتوئید ادونتوژنیک تومور (د) کلسیفاینگ ادونتوژنیک سیست

۵۲- کدام ضایعه از لحاظ هیستولوژی نمای بدخیم دارد ولی از نظر بالینی رفتار خوش خیمی نشان می‌دهد؟

الف) بیوژنیک گرانولوما (ب) ژانت سل گرانولوما

ج) فاسیتیس ندولار (د) اپولیس حاملگی

۵۳- دختر بچه ۳ ماهه به دلیل ضایعه اگزوفیتیک پایه‌دار در قدام فک بالا به شما ارجاع داده شده و در آزمایش

ادرار وی میزان بالای Vanilly mandelic acid گزارش شده است. محتمل ترین تشخیص کدامست؟

الف) اپولیس مادرزادی (ب) گرانولر سل تومور

ج) ملانوتیک نورواکتودرمال تومور (د) نوروفیروما

۵۴- برای بیمار با سابقه اندوکاردیت عفونی ثانویه به بیماری قلبی مادرزادی، جراحی پریدونتال انجام شده است. در حین کار پزشک متوجه می شود که بیمار آنتی بیوتیک پروفیلاکسی خود را فراموش کرده است. کدام راهکار توصیه می شود؟

الف) آموکسی سیلین ۵۰۰ میلی گرم هر ۸ ساعت تا یک هفته پس از اتمام کار

ب) ۲ گرم آموکسی سیلین تا حداکثر ۲ ساعت پس از شروع کار

ج) توقف درمان و موکول کردن آن به جلسه دیگر

د) پنی سیلین تزریقی ۱۲۰۰۰۰۰ پس از اتمام کار

۵۵- در بیماری با سابقه انفارکتوس میوکارد تحت درمان با وارفارین، انجام کدام آزمایش جهت برآورد خطر خونریزی قبل درمان الزامی است؟

ب) CBC

الف) INR

د) Thrombin Time

ج) Bleeding Time

۵۶- در بیمار مبتلا به دیابت که علائمی از خشکی دهان را نشان می دهد، کدام ماده در بزاق کاهش می یابد؟

د) کلراید

ج) گلوکز

ب) کلسیم

الف) سدیم

۵۷- کدام دارو علیرغم متابولیسم کبدی می تواند در تجویز با مقادیر بالا، ایجاد سمیت کلیوی کند؟

د) استامینوفن

ج) تتراسیکلین

ب) آسپیرین

الف) آسیکلوویر

۵۸- کدام یک از بیحس کننده های موضعی در گروه B قرار داشته و تجویز آن در طی دوران بارداری بلامانع است؟

ب) بوپی واکائین

الف) پریلوکائین

د) آرتیکائین

ج) مپی واکائین

۵۹- در بیماران در معرض خطر بحران آدرنال، جهت کاهش درد و استرس همه موارد پیشنهاد می شود به جزء:

الف) آرام بخشی توسط نیتروس اکساید- اکسیژن      ب) تجویز کلرودیازپوکساید قبل درمان

ج) تجویز باربیتوراتها قبل کار      د) تزریق بی حسی طولانی اثر (بوپی واکائین)

۶۰- خانم ۴۸ ساله با سابقه بیماری تیروئید با عفونت حاد دندان ۶ جهت معالجه ریشه به شما مراجعه می کند. در حین پالپوتومی دندان، بیمار دچار علائمی نظیر بیقراری، ناکی کاردی، لرزش و تعریق می شود. در صورت احتمال وقوع طوفان تیروئیدی، بهترین اقدام، تجویز کدام مورد است؟

الف) لووتیروکسین      ب) پروپیل تیوراسیل

ج) سرم نمکی      د) دیازپام

### پاسخنامه:

سؤال ۴۱- گزینه (ج) ← مشابه سؤال ۱۳ صفحه ۱۱ جزوه و سؤال ۲ آزمون شماره ۲

سؤال ۴۲- گزینه (ج)

سؤال ۴۳- گزینه (ج) ← با خواندن توضیحات سؤال ۱۵ (صفحه ۱۸) و ۳۹، ۴۱ و ۴۲ (صفحه ۲۰) Case مطرح شده می توان تشخیص داد.

سؤال ۴۴- گزینه (ج)

سؤال ۴۵- گزینه (الف)

سؤال ۴۶- گزینه (د) ← مشابه سؤال ۲۲ و ۲۳ در صفحه ۲۷

سؤال ۴۷- گزینه (ب)

سؤال ۴۸- گزینه (الف) ← مشابه سؤال ۴۱ که ویژگی های خال سفید اسفنجی را توضیح داده است.

سؤال ۴۹- گزینه (ب) ← سؤالات ۲ و ۳ صفحه ۳۴ هم از همین جدول طرح شده که با خواندن جدول می توان به این سؤال پاسخ داد.

سؤال ۵۰- گزینه (د)

سؤال ۵۱- گزینه (ج)

سؤال ۵۲- سؤال ۷ صفحه ۴۰ و سؤال ۸ صفحه ۴۱ مشابه همین سؤال هستند.

سؤال ۵۳- گزینه (ج)

سؤال ۵۴- گزینه (ب) ← سؤال ۶ صفحه ۴۸

سؤال ۵۵- گزینه (الف) ← سؤال ۹ صفحه ۵۳

سؤال ۵۶- گزینه (الف) ← سؤال ۲ صفحه ۶۰ + سؤال ۱۷ آزمون شماره ۱

سؤال ۵۷- گزینه (د) ← سؤال ۵ صفحه ۵۶ هم از همین جدول طرح شده

موسسه دندانپزشکی

سؤال ۵۸- گزینه (الف) ← سؤال ۲ و سؤال ۵ صفحه ۷۲

www.dinshahin.ir

سؤال ۵۹- گزینه (ج) ← سؤال ۳ صفحه ۶۴

سؤال ۶۰- گزینه (ب) ← سؤال ۱۰ صفحه ۶۹