

موسسه رزیدنتی دندانپزشکی ماهان

۰۲۱ - ۴۲ ۸۸ ۱۱۰۰

۶۱- کدام گزینه با میکروگلوسی ارتباط دارد؟

(ب) هیپوپلازی مندیبل

(الف) سندرم داون

(د) لنفانژیوم

(ج) آنژیوادم

۶۲- شایع ترین تظاهر بالینی عفونت اولیه HSV (ویروس هرپس سیمپلکس) کدام است؟

(ب) ژنژیواستوماتیت هرپتیک حاد

(الف) فارنژیوگلوستیت

(د) ضایعات وزیکولار در قدام و خلف دهان

(ج) ضایعات وزیکولار پوستی

۶۳- در کلیه بیماری های زیر pulp stone مشاهده می شود، بجز:

(ب) dentin dysplasia type II

(الف) regional odontodysplasia

(د) dentinogenesis imperfect I

(ج) dentin dysplasia type Id

۶۴- برای شناسایی کدام ضایعه می توان از رنگ آمیزی «ماسون تری کروم» استفاده کرد؟

(ب) لیپوسارکوما

(الف) لیومیوسارکوما

(د) آنژیوسارکوما

(ج) نوروفیبروسارکوما

۶۵- احتمال مشاهده کدامیک از علائم بدخیمی میکروسکوپی در Ancient Schwannoma بیشتر است؟

(ب) Hemosiderin deposit

(الف) Atypical mitosis

(د) Infiltrative behavior

(ج) Nuclear atypia

۶۶- کدامیک از موارد زیر در پیش‌بینی **occult cervical lymph node metastasis** مهم است؟

الف) presence of extracapsular spread

ب) number of positive nodes

ج) tumor thickness

د) tumor grade

۶۷- ملانوسیت‌های دندریتیک خوش خیم متعدد در سرا سر ضخامت اپی‌تلیوم، در نمای هیستوپاتولوژیکی کدام

ضایعه دیده می‌شود؟

الف) Oral melanotic macule

ب) Oral melanoacanthoma

ج) Ephelis

د) Lentigo simplex

۶۸- کدام نوع آفت، بعد از بلوغ آغاز می‌شود و بعد از گذشت زمان ممکن است اسکار آن به میزان قابل ملاحظه‌ای

رسیده و در موارد نادر باعث محدودیت در بازکردن دهان شود؟

الف) مینور

ب) ماژور

ج) هرپتی فرم

د) ساده

۶۹- مکان شایع بروز زخم‌های دهانی در بیماری نوتروپنی کدام است؟

الف) لثه

ب) کام

ج) زبان

د) کف دهان

موسسه رزیدنتی دندانپزشکی ماهان

۰۲۱ - ۴۲ ۸۸ ۱۱۰۰

۷۰- موکوپیدرموئید کارسینوما در کدام مورد بدترین پیش‌آگهی را دارد؟

الف) نوع داخل استخوانی

ب) غده بزاقی تحت فکی

د) غدد بزاقی مینور

ج) غده بزاقی پاروتید

۷۱- رنگ‌آمیزی PTAH جهت تشخیص کدامیک از تومورهای غدد بزاقی مفید خواهد بود؟

ب) canalicular adenoma

الف) Pleomorphic adenoma

د) oncocytoma

ج) basal cell adenoma

۷۲- کدام تغییر در بررسی هیستوپاتولوژیک ضایعات بزاقی سندرم شوگرن مشاهده می‌شود؟

الف) تخریب واحدهای آسینار ناشی از ارتشاح سلول‌های لنفوسیت

ب) هیپرتروفی سلول‌های آسینار، ۲ تا ۳ برابر اندازه نرمال

ج) تجمع گرانول‌های زیموژن در سیتوپلاسم سلول‌های آسینار

د) ساختارهای داکتال پوشیده از سلول‌های مکعبی

۷۳- در نمای هیستوپاتولوژیک بیماری پاژه، تراکول‌های استخوانی چه شکلی بخود می‌گیرند؟

ب) کروی لایه لایه هم مرکز

الف) حروف چینی

د) طرح موزاییکی

ج) ریشه زنجیلی

موسسه رزیدنتی دندانپزشکی ماهان

۰۲۱ - ۴۲ ۸۸ ۱۱۰۰

۷۴- دختری ۹ ساله با علائم دفورمیتی استخوان های دراز، آسیمتری صورت و میگزوم داخل عضله مراجعه نموده

است. ابتدا به کدام سندرم محتمل است؟

McCune -Albright (ب)

Jeffe - Lichtenstein (الف)

Mazabraud (د)

Polyostotic Fibrous Dysplasia (ج)

۷۵- مشاهده نواحی اپک در رادیوگرافی آملوبلاستومای نوع دسموپلاستیک ناشی از چیست؟

(ب) متاپلازی اوستوس

(الف) مواد شبه دندانی

(د) مواد مینرالیزه توسط تومور

(ج) استخوان راکتیو

۷۶- بیشترین شباهت کیست ادنتوژنیک ارتوکراتینیزه با در نظر گرفتن یافته‌ها بالینی و رادیوگرافیکی با کدام گزینه

زیر است؟

(ب) دنتی جروس کیست

(الف) ادنتوژنیک کراتوسیست

(د) لترال پرودنتال کیست

(ج) کیست ادنتوژنیک کلسیفیه

۷۷- در رابطه با ماهیت سلول‌های شبحی در **Calcifying odontogenic cyst** همه مکانیسم‌های زیر مطرح

می‌باشد، بجز:

(ب) تجمع پروتئین‌های مینایی

(الف) نکروز انعقادی

(د) تأثیر القایی اپیتلیوم مزانشیم

(ج) کراتینیزاسیون اپیتلیالی

موسسه رزیدنتی دندانپزشکی ماهان

۰۲۱ - ۴۲ ۸۸ ۱۱۰۰

۷۸- «بدشکلی دستکش مانند انگشتان» از علائم کدام بیماری است؟

(ب) پمفیگوئید بولوز

(الف) پمفیگوس ولگاریس

(د) پمفیگوئید غشای مخاطی

(ج) اپیدرمولایزیس بولوزا

۷۹- «تراکم تونوفیلامنت‌های کراتین در ناحیه اطراف هسته سلول‌های لایه‌های سطحی اپی‌تلیوم» در بررسی

میکروسکوپ کدام ضایعه دیده می‌شود؟

(الف) Hereditary benign intraepithelial dyskeratosis

(ب) White sponge nevus

(ج) Dyskeratosis congenital

(د) Hereditary mucoepithelial dysplasia

۸۰- «دندان‌های نهفته متعدد با فضا‌های فولیکولی مشخص» با کدام بیماری همراه است؟

(ب) Tay sacks disease

(الف) Gaucher disease

(د) Mucopolysaccharidosis

(ج) Niemann pick disease

۶۱- گزینه «ب» صحیح است.

میکروگلوسیا غالباً همراه با هایپرپلازی مندیبل می‌باشد.

۶۲- گزینه «ب» صحیح است.

ژنژیواسترماتیت هرپتیک حاد در افرادی با سنین ابتدایی که در معرض HSV-1 قرار می‌گیرند، مشاهده می‌شود.

موسسه رزیدنتی دندانپزشکی ماهان

۰۲۱ - ۴۲ ۸۸ ۱۱۰۰

۶۳- گزینه «د» صحیح است.

در dentin dysplasia type Id و dentin dysplasia II ، regional odantodysplasia سنگ‌های پالپی می‌تواند مشاهده شوند.

۶۴- گزینه «الف» صحیح است.

ص ۵۸ کتاب ماهان ، نکته ۵

از ویژگی‌های میوسیوسار کوما، PAS مثبت و رنگ‌آمیزی باتری کروم ماسون می‌باشد.

۶۵- گزینه «الف» صحیح است.

ص ۴۷ کتاب ماهان، جواب ۱۸

در ancient schwannoma تغییرات خونریزی، رسوب هموسیورین، فیبروز و آتیپی هسته مشاهده می‌شود.

۶۶- گزینه «ج» صحیح است.

عمق مفاهیم یا ضخامت تومور ممکن است در پیش‌گویی متاستاز Occult cervical lymph node در تومورهای زودهنگام T- stoge کمک کننده باشد.

۶۷- گزینه «الف» صحیح است.

ص ۲۴ کتاب ماهان ، آزمکون ۳ ، سوال ۷

ملانواکانتوما با تعداد فراوان ملانولیت‌های دندریتیک خوش خیم مشخص می‌شوند که در سرتاسر اپی‌تلیوم ضایع پراکنده داشته‌اند. ملانولیت‌های لایه بازال نیز افزایش می‌یابند.

۶۸- گزینه «ب» صحیح است.

آفت ماژور علائم فوق را ممکن است نشان دهد.

۶۹- گزینه «الف» صحیح است.

ضایعات دهانی نوتروپنی شامل زخم‌هایی است که معمولاً مخاط لثه را مبتلا می‌کند.

۷۰- گزینه «ب» صحیح است.

ص ۱۲۶ کتاب ماهان ، نکته ۱۷۵.

موسسه رزیدنتی دندانپزشکی ماهان

۰۲۱ - ۴۲ ۸۸ ۱۱۰۰

بدلایل ناشناختی پروگنوز تومور موکوپیدرموئید کارسینوما در غده تحت فکی بدتر از پاروتید است.

۷۱- گزینه «د» صحیح است.

گرانول‌هایی اتنکوسیتوما را می‌توان توسط میکروسکوپ نوری با رنگ‌آمیزی PTAH تشخیص داد.

۷۲- گزینه «الف» صحیح است.

در سندرم شوگرن ارتشاح لنفوسیتی در غدد بزاقی به همراه تخریب واحدهای آمیبی می‌باشند.

۷۳- گزینه «د» صحیح است.

تشخیص ۱۰۵ کتاب ماهان.

... نمای ویژه کاراکترستیک، پازل یا موزاییک (gigsow pozzlo) در پاژت است.

۷۴- گزینه «د» صحیح است.

Mazabroud lyxlrome با دیسپلازی فیبرو و میگه دمای داخل عضلان مشخص می‌شود.

۷۵- گزینه «ب» صحیح است.

نمای رادیوگرافیک Mixed مرتبط با متاپلازی استخوانی در سپتای سیروزه متراکم است. که از مشخصات آملوبلاستومای دسموپلاستیک است.

۷۶- گزینه «ب» صحیح است.

حدود دوسوم کیست‌های ادنتوژنیک از توکراتیزره به شکل ضایعه‌ای هستند که از نظر کلینیکی و رادیوگرافی یک کیست دنتی ژروس را نشان می‌دهند.

موسسه رزیدنتی دندانپزشکی ماهان

۰۲۱ - ۴۲ ۸۸ ۱۱۰۰

۷۷- گزینه «د» صحیح است.

ماهیت سلول‌های ghost می‌تواند نکروز انعقادی، تجمع پروتئین‌های مینایی، کراتینیزاسیون نرمال یا نامه‌های اپی‌تلیوم ادنتو باشد.

۷۸- گزینه «ج» صحیح است.

در اپیدوسولیز سولوز در شکلی دستکش مانند می‌تواند مشاهده شود.

۷۹- گزینه «ب» صحیح است.

با رنگ‌آمیزی پاپاتیکولانو که تراکم دور هسته‌ای تونوفیلانیت‌های کراتینی در خال سفید اسفنجی را نشان می‌دهد.

۸۰- گزینه «الف» صحیح است.

تعداد زیادی دندان هسته با فضاهای فولیکولی واضح در موکوپلی ساکاریدوزیس مشاهده می‌شود.

