

## انطباق سؤالات اندودانتیکس آزمون دستیاری ۱۴۰۲ با خدمات ماهان

۲۱- کدام مورد در خصوص تغییرات پالپی در افراد مسن غلط است؟

الف) کاهش ادونتوبلاستها

ب) کاهش کلاژن

ج) کاهش عروق و اعصاب

د) کاهش ماده زمینه‌ای

پاسخ: گزینه ب / فصل ۲ صفحه ۳۰ درسنامه

۲۲- کدام مورد در خصوص آرتیفکت beam hardening صحیح نیست؟

الف) به دلیل وجود ساختارهای فلزی ایجاد می‌شود.

ب) می‌توان مشابه یک کانال اضافه باشد.

ج) به صورت خطوط پراکنده روشن دیده می‌شود.

د) باعث ایجاد منفی کاذب در تشخیص می‌شود.

پاسخ: گزینه ج / فصل ۳ صفحه ۳۹ درسنامه

۲۳- کدام گزینه در خصوص تشخیص شکستگی عمودی ریشه صحیح است؟

الف) استاندارد طلایی در تشخیص آن CBCT می‌باشد.

ب) در صورت وجود پرکردگی در کانال ریشه اختصاصیت CBCT افزایش می‌یابد.

ج) در تشخیص آن CBCT نسبت به رادیوگرافی دو بعدی حساسیت بیشتری دارد.

د) در تشخیص آن cBCT نسبت به رادیوگرافی دو بعدی اختصاصیت بیشتری دارد.

پاسخ: گزینه ج / فصل ۳ صفحه ۴۱ و ۴۲ درسنامه

۲۴- کدام گزینه در خصوص تست سرما صحیح است؟

الف) تحلیل لثه حساسیت به تست سرما را کاهش می‌دهد.

ب) کلسیفیکاسیون متامورفوزیس باعث ایجاد پاسخ مثبت کاذب می‌شود.

ج) تست سرما باعث تحریک الیاف A بتا می‌شود.

د) دقیق‌ترین تست در مواقع وجود کلسیفیکاسیون متامورفوزیس تست سرما می‌باشد.

پاسخ: گزینه الف / فصل ۴ صفحه ۴۵ و ۴۶ درسنامه

۲۵- شایع‌ترین علت دردهای غیرادونتوزنیک کدام است؟

الف) اختلالات سایکولوژیک

ب) اختلالات مفصلی

ج) دردهای نورووسکولار

د) دردهای عضلانی اسکلتی

**پاسخ: گزینه د / فصل ۵ صفحه ۶۰ درسنامه**

۲۶- کدام گزینه در خصوص حفره استخوانی استافنه صحیح است؟

الف) در ناحیه قدام شایعتر از خلف است.

ب) در طول زمان اندازه آن بزرگ می‌شود.

ج) معمولاً یکطرفه است.

د) نسبت به کانال آلوئولار تحتانی بالاتر قرار گرفته است.

**پاسخ: گزینه ج / فصل ۵ صفحه ۶۶ درسنامه**

۲۷- براساس فرم ارزیابی سختی درمان انجمن اندودانتیست‌های آمریکا کدام گزینه در دسته متوسط قرار

دارد؟

الف) انحنای S شکل

ب) فیوژن

ج) تارودونتیسم

د) پره مولر مندیبل دو ریشه

**پاسخ: گزینه ج / فصل ۶ صفحه ۸۰ (جدول) درسنامه**



۲۸- کدام یک از موارد زیر قابلیت انحلال بافت پالپی را دارد؟

الف) کلسیم هیدروکساید

ب) کلرهگزیدین

ج) کلروفرم

د) EDTA

**پاسخ: گزینه الف / فصل ۷ صفحه ۸۸ درسنامه**

۲۹- کدام مورد باعث افزایش موفقیت تزریق بلاک عصب آلوئول تحتانی (IANB) می‌شود؟

الف) اینفیلتره لیدوکائین بعد از تطریق IANB

ب) استفاده از لیدوکائین بافر شده

ج) تزریق سریع

د) بی‌حسی داخل استخوانی می‌ی واکایین بعد از تزریق IANB

پاسخ: گزینه د / فصل ۸ صفحه ۱۰۰ درسنامه

۳۰- کدام گزینه در خصوص اورژانس بین جلسات نادرست است؟

الف) تکمیل درمان در یک جلسه ریسک flare up را کاهش می‌دهد.

ب) Flare up در دندان‌های وایتال شایع نیست.

ج) خروج دبری به ورای کانال ریسک flare up را افزایش می‌دهد.

د) بزرگ‌ترین جنبه‌ی درمان flare up اطمینان خاطر دادن به بیمار است.

پاسخ: گزینه الف / فصل ۹ صفحه ۱۲۷ درسنامه

۳۱- کدام یک از سیلرهای زیر در تکنیک single cone کاربرد دارد؟

الف) AH26

ب) Grossman

ج) Endorez

د) Sealapex

پاسخ: گزینه ج / فصل ۱۵ صفحه ۲۲۵ درسنامه

۳۲- ضخامت مناسب MTA Plug در درمان اپکسیفیکیشن چند میلی‌متر است؟

الف) دو

ب) سه

ج) چهار

د) پنج

پاسخ: گزینه د / فصل ۱۰ صفحه ۱۴۴ درسنامه

۳۳- وضعیت پالپ در کدام یک از درمان‌های زیر با بقیه متفاوت است؟

الف) Apexogenesis

ب) Apexification

ج) Revascularization

د) regeneration

پاسخ: گزینه الف / فصل ۱۰ صفحه ۱۴۴ و ۱۴۵ درسنامه

۳۴- در کدام یک از موارد ریپلنتیشن پس از Avulsion پوشش سطح ریشه با خانواده تتراسیکلین توصیه

می‌شود؟

- الف) دندان‌های با آپکس بسته و بیشتر از یک ساعت بیرون ماندن در محیط خشک  
 ب) دندان‌های با آپکس باز و بیشتر از یک ساعت بیرون ماندن در محیط خشک  
 ج) دندان‌های با آپکس باز و کمتر از یک ساعت بیرون ماندن در محیط خشک  
 د) دندان‌های با آپکس باز صرف‌نظر از زمان

پاسخ: گزینه ج / فصل ۱۱ صفحه ۱۵۹ درسنامه

۳۵- در آماده‌سازی کانال ریشه در درمان مجدد کدام گزینه زیر همیشه باعث افزایش موفقیت درمان می‌شود؟

- الف) استفاده از تکنیک‌های آماده‌سازی چرخشی  
 ب) شکل‌دهی مجدد کانال ریشه  
 ج) دستیابی به Apical patency  
 د) استفاده از داروهای داخل کانال بین جلسات

پاسخ: گزینه ج / فصل ۱۹ صفحه ۲۷۷ و ۲۷۸ درسنامه

۳۶- تغییر رنگ ناشی از کدامیک از موارد زیر شایع‌تر می‌باشد؟

- الف) بقایای بافت پالپ  
 ب) مواد پرکننده کانال  
 ج) ترمیم‌های کامپوزیتی  
 د) ترمیم‌های فلزی

پاسخ: گزینه ب / فصل ۱۷ صفحه ۲۴۸ درسنامه

۳۷- سطح مقطع فایل‌های K-flex به چه شکلهایی می‌تواند باشد؟

- الف) مربع - مثلث  
 ب) مربع - لوزی  
 ج) مثلث - لوزی  
 د) لوزی - قطره اشکی

پاسخ: گزینه ب / فصل ۷ صفحه ۸۷ درسنامه

۳۸- در معاینه بالینی کدام یک از موارد زیر احتمال وجود سینوس ترکت کمتر است؟

- الف) شکستگی عمودی ریشه  
 ب) آبسه پریودنتال  
 ج) آبسه حاد پری اپیکال  
 د) استئومیلیت

پاسخ: گزینه ج / فصل ۴ صفحه ۴۴ درسنامه

۳۹- کانال‌های فورکا در کدام یک از دندان‌های زیر کمترین شیوع را دارد؟

الف) مولر اول ماگزایلا

ب) مولر دوم ماگزایلا

ج) مولر اول مندیبل

د) مولر دوم مندیبل

پاسخ: گزینه ب / فصل ۱۲ صفحه ۱۷۱ درسنامه

۴۰- در دندان‌های پرمولر اغلب کدامیک از صدمات ناشی از ضربه دیده می‌شود؟

الف) Uncomplicated crown fracture (شکستگی غیر پیچیده تاج)

ب) Complicated crown fracture (شکستگی پیچیده تاج)

ج) Crown-root fracture (شکستگی تاج - ریشه)

د) Root fracture (شکستگی ریشه)

پاسخ: گزینه ج / فصل ۱۱ صفحه ۱۵۳ درسنامه



**ماهان**  
موسسه دندانپزشکی